

Gesetz- und Verordnungsblatt

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgabe A

17. Jahrgang

Ausgegeben zu Düsseldorf am 23. August 1963

Nummer 35

| Glied.-Nr. | Datum | Inhalt | Seite |
|------------|------------|---|-------|
| 2121 | 8. 8. 1963 | Achte Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäß in Apotheken (8. Erg. Abgabe-VO) | 271 |
| 302 | 8. 8. 1963 | Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Errichtung von Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten | 279 |

2121

**Achte Verordnung
zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäß in Apotheken (8. Erg. Abgabe-VO)**

Vom 8. August 1963

Auf Grund des § 29 Abs. 1 und 2 des Ordnungsbehörden gesetzes vom 16. Oktober 1956 (GS. NW. S. 155) wird für das Land Nordrhein-Westfalen verordnet:

Artikel 1

Die Anlage zu der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäß in Apotheken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW. S. 39) zuletzt geändert durch die 7. Erg. Abgabe-VO vom 20. März 1963 (GV. NW. S. 160), wird durch die beigelegte Anlage ersetzt.

Artikel 2

Die Verordnung tritt am 15. September 1963 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. August 1963

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Weyer

Abschnitt I

Anlage

- Carbaminoylcholinchlorid
 Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-bromid
 Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-methylsulfat; Prostigmin

Abschnitt II

- Acetanilid
 5-Acetylamino-1,3,4-thiodiazol-2-sulfonamid und seine Salze; Acetazolamid
 Aconiti Tubera
 zum äußerem Gebrauch in Salben nicht verschreibungs-pflichtig
 Actinomycin C
 Adrenocorticotropes Hypophysenvorderlappenhormon; ACTH, Corticotrophin
 (Aethinyl-cyclohexyl)-carbamat; Aethinamat
 Aethylbromid 0,5 g
 Aethyl- β -chlorvinyl-aethinyl-carbinol; Aethchlorvynol
 3-Aethyl-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Aethadion
 Aethyljodid
 Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch
 β -Aethyl- β -methyl-glutarimid; Bemegrid
 1-Aethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-on-3-carbonsäure, ihre Salze und Ester; Nalidixinsäure
 2-Aethyl-thioisonicotinsäureamid und seine Salze; Aethionamid
 Agarizinsäure 0,1 g
 Akonitin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze;
 Aldosteron
 N-Alkyl-atropinium-Salze
 N-Allyl-3-hydroxy-morphinan und seine Salze; Levallorphan
 Allyl-isopropyl-acetylcarbamid und seine Salze; Apronalid
 N-Allyl-normorphin und seine Salze; Nalorphin
 4-Amino-benzolsulfonamid (Sulfanilamid), 4-Amino-benzolsulfocarbamid (Sulfanilcarbamid), 4-Amino-benzolsulfo guanidin (Sulfanilguanidin), ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze — die wiederholte Abgabe zum äußerem Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
 1-(4'-Aminobenzoyl)-2,2-dimethyl-3-diaethylamino-propanol-(1) und seine Salze; Dimethocain
 ϵ -Aminocapronsäure und ihre Salze
 4-Amino-N-(2'-diaethylaminoethyl)-benzamid und seine Salze; Procainamid
 D-4-Amino-3-isoxazolidinon; Cycloserin
 4-Aminomethyl-benzolsulfonamid und seine Verbindungen; Mafenid
 4-Amino-N¹⁰-methyl-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze; Amethopterin, Methotrexat
 6-Aminopenicillansäure-Abkömmlinge soweit es sich handelt um:
 6-[2',6'-Dimethoxy-benzoyl]-amino]-penicillansäure und ihre Salze; Methicillin
 6-[5'-Methyl-3'-phenyl-isoxazolyl-(4')-carbamino]-penicillansäure und ihre Salze; Oxacillin
 6-Phenoxyacetyl-amino-penicillansäure und ihre Salze; Phenoxymethylpenicillin, Penicillin-V-Säure

| | | |
|--|--|---|
| 6-(α -Phenoxybutyramino)-penicillansäure und ihre Salze; Propicillin | | 3-Dichlormethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Trichlormethiazid |
| 6-(α -Phenoxypropionyl-amino)-penicillansäure und ihre Salze; Phenoxyaethylpenicillin, Phenethicillin | | 3-Isobutyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Thiabutazid |
| 6-Phenylacetylarnino-penicillansäure, ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze; Benzylpenicillin, Penicillin G | | 2-Methyl-3-(2,2,2-trifluoraethyl-thiomethyl)-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Polythiazid |
| die wiederholte Abgabe zum äußerem Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist | | 3- β -Phenylaethyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze |
| 4-Amino-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze; Aminopterin | | 6-Trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Hydroflumethiazid |
| 4-Amino-salizylsäure (PAS), ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze | | d-Benzoylpseudotropincarbonsäurepropylester und seine Salze nur zur Anwendung am Auge |
| Aminosidin und seine Salze | | α -Benzoyl-triaethylamin (1-Phenyl-2-diaethylamino-propanon-1) und seine Salze; Diaethylpropion |
| Amylenhydrat | | Benztropin und seine Salze |
| Amphotericin B auch als Komplex mit Natrium-desoxycholat | | 1-Benzyl-2-(5'-methyl-3'-isoxazolylcarbonyl)-hydrazin und seine Salze; Isocarboxazid |
| Amylnitrit | 0,2 g | Bernsteinsäure-bis-(cholin-ester)-Salze |
| Apiol | | Biguanide und ihre Salze zur Diabetesbehandlung |
| Apomorphin und seine Salze | | Bis-aethylsulfon-dimethyl-methan; Sulfonal |
| Arekolin und seine Salze | | Bis-aethylsulfon-methyl-aethyl-methan; Methylsulfonal |
| Arsen und seine Verbindungen | | 3-[N-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-2-amino-propionsäure und ihre Salze; Sarcolysin, Melphalan |
| Abgabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig | | 4-[N'-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-buttersäure und ihre Salze; Chlorambucil |
| Askaridol | | N,N-Bis-(2-chloraethyl)-N',O-propylenphosphorsäure-esterdiimid; Cyclophosphamid |
| Aspidoflizin | | N,N'-Bis-[2-(2'-chlorbenzyl-diaethyl-ammonium)-aethyl]-oxamid-Salze; Ambenonium-Salze |
| Atropin und seine Salze | 0,001 g | Bis-[3,3'-(4-hydroxycumarinyl)]-essigsäureaethylester; Aethylbiscumacetat |
| Barbitursäureabkömmlinge, ihre Salze und Molekülverbindungen | | 2,5-Bis-methoxyethoxy-3,6-bis-aethylenimino-benzochinon-(1,4) |
| Abgabe von Molekülverbindungen als Arzneifertigware in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde zulässig. Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch. | | N,N-Bis-(N-methyl-N-phenyl-tert.-butyl-acetamido)- β -hydroxy-aethylamin und seine Salze; Oxethazain |
| Belladonnae, Folia | 0,2 g | 2,5-Bis-n-propoxy-3,6-bis-aethyleniminobenzochinon-(1,4); Inprochon |
| Belladonna-Zubereitungen | 0,05 g | Bittermandelwasser |
| | berechnet als Extractum Belladonnae DAB.6 | 2,0 g |
| | zum äußerem Gebrauch nicht verschreibungspflichtig | Bleiacetat |
| Benzaldehyd-thiosemicarbazone und seine Abkömmlinge | | Bleieissig nicht verschreibungspflichtig |
| Benzaldehydyanhydrin | 0,005 g | Bleijodid |
| N-Benzhydryl-N'-trans-cinnamyl-diaethylendiamin und seine Salze; Cinnarizin | | N-(2-Brombenzyl)-N-aethyl-N,N-dimethyl-ammoniumsalze |
| Benzilsäure-(2-diaethylaminoethyl)-ester und seine Salze; Benactyzin | | 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-aethan; Halothan |
| Benzilsäuretropinester und seine Salze | | Bromoform |
| 1,2,4-Benzothiadiazin-1,1-dioxyd-Abkömmlinge soweit es sich handelt um: | | 0,3 g |
| 3-Aethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Aethiazid | | Bruzin und seine Salze |
| 3-Benzyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Bendroflumethiazid | | 0,01 g |
| 6-Chlor-3-chlormethyl-2-methyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd; Methylclothiazid | | Butan-1,4-diol-bis-(methansulfonat); Busulfan |
| 6-Chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Chlorothiazid | | 4'-Butylaminobenzoyl-2-dimethylamino-aethanol-(1) und seine Salze; Tetracain |
| 6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Hydrochlorothiazid | | (4-Butylmercapto-benzhydryl)-(2-dimethylaminoethyl)sulfid und seine Salze; Captodiam |
| 3-Cyclopentylmethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Cyclopenthiazid | | 2-Butyloxy-chinolin-4-carbonsäure-(2'-diaethylaminoethylamid) und seine Salze; Chinchocain, Dibucain |
| | berechnet als Extractum Calabar Erg. B.6 | Calabar, Semen |
| | 0,02 g | Calabar-Zubereitungen |
| | Calciferol (Vitamin D ₂) | Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter und dergleichen nicht verschreibungspflichtig |

| | |
|---|--|
| Cannabis sativa-Wirkstoffe und ihre Verbindungen zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig | |
| Cannabis sativae var. indicae, Herba zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig | |
| Cantharides zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig | |
| 2-Carbaethoxymercapto-1-methylimidazol; Carbimazol | |
| Carzinophilin, Carzinophilin A | |
| 7-Chlor-4-[4'-(N-aethyl-N-β-hydroxyaethylamino)-1'-methylbutylamino]-chinolin und seine Salze; Hydroxychlorochin | |
| Chloralformamid | |
| Chloralhydrat | |
| Chloralose | |
| Chloramphenicol, seine Ester sowie deren Verbindungen die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist | |
| 7-Chlor-2-aethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-sulfamyl-chinazolin und seine Salze; Chinaethazon | |
| 1-p-Chlorbenzhydryl-4-(p-tert.-butylbenzyl)-diaethylen-diamin und seine Salze; Buclizin | |
| 1-p-Chlorbenzhydryl-4-[2'-(2'-hydroxyaethoxy)-aethyl]-diaethylendiamin und seine Salze; Hydroxyzin | |
| 1-p-Chlorbenzhydryl-4-m-methylbenzyl-diaethylendiamin und seine Salze; Meclizin, Meclozin | |
| 1-(4'-Chlorbenzhydryl)-4-methyl-diaethylendiamin und seine Salze; Chlorcyclizin, Histachlorazin | |
| 4-Chlorbenzol-1,3-disulfonamid und seine Salze | |
| 5-Chlor-2-benzoxazolinon und seine Salze; Chloroxazon | |
| 7-Chlor-4-(4'-diaethylamino-1'-methylbutylamino)-chinolin und seine Salze; Chlorochin | |
| 7-Chlor-4-(3'-diaethylaminomethyl-4'-hydroxyphenyl-amino)-chinolin und seine Salze; Amodiachin | |
| 2-Chlor-9-(3'-dimethylamino-propyliden)-thiaxanthen (Trans-Form) und seine Salze; Chlorprothixen | |
| 2-Chlor-9-[3-(N'-β-hydroxyaethyl-piperazino)-propyliden]-thiaxanthen und seine Salze | |
| 7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxyd und seine Salze; Chlordiazepoxid | |
| 4-Chlorphenoxyessigsäure-isopropylhydrazid | |
| 2-(4'-Chlorphenyl)-3-methyl-4-methathiazanon-1,1-dioxyd und seine Salze; Chlormezanon, Chlormetazanon | |
| Chloroform 0,5 g zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprozent enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig | |
| Chlortetracyclin und seine Salze die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist | |
| Chlor-tris-(p-methoxyphenyl)-aethylen; Chlorotrianisen | |
| Cholecalciferol auch als Molekülverbindung mit Cholesterin (Vitamin D ₃) Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter und dergleichen nicht ver- schreibungspflichtig | |
| Colchici, Semen | |
| Colchicumalkaloide, auch hydrierte, und ihre Salze (z. B. Kolchizin) | |
| Colistin und seine Salze | |
| Colocynthidis, Fructus 0,3 g | |
| Colocynthis-Zubereitung 0,05 g berechnet als Extractum Colocynthidis DAB.6 | |
| Conii, Herba zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen und als Zusatz zu erweichenden Kräutern nicht verschreibungspflichtig | |

Convallaria-Glykoside

Cortisone
soweit es sich handelt um:

- 1-Dehydro-11-dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Dehydrocortison, Prednison
- 1-Dehydro-6 α,9 α-difluor-16 α,17 α-dihydroxy-corticosteron (6,9-Difluor-16-hydroxy-prednisolon) und seine Aether; Fluocinolon
- 1-Dehydro-9-fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron (9-Fluor-16-oxy-prednisolon), seine Aether und Ester; Triamcinolon
- 1-Dehydro-6-fluor-16-methyl-17-hydroxycorticosteron (6-Fluor-16-methyl-prednisolon) und seine Ester; Paramethason
- 1-Dehydro-9-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron (9-Fluor-16-methyl-prednisolon), seine Ester sowie deren Salze; Dexamethason
- 1-Dehydro-16-methylen-17-hydroxy-corticosteron (16-Methylen-prednisolon), seine Ester und deren Salze
- 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon); Fluorometholon
- 1-Dehydro-6-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Methylprednisolon
- 1-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Dehydro-Hydrocortison, Prednisolon
- 11-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Cortison, Compound E
- 6-Fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron(6-Fluor-16-hydroxy-hydrocortison) und seine Aether
- 9-Fluor-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Fluorhydrocortison
- 17-Hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Hydrocortison, Compound F
die wiederholte Abgabe der Cortisone zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist, ausgenommen bis zu 20 g einer Zubereitung zum äußeren Gebrauch, die je g nicht mehr als 0,25 mg 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon) enthält.
- Curare
- Deksamethylen-1,10-bis-(methylcarbaminoyl-3-hydroxy-phenyl-trimethylammoniumbromid); Demecarium-bromid
- Demethyl-chlortetracylin und seine Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
- Desacetyl-methyl-kolchizin und seine Salze; Demecolcin
- 11-Desoxycorticosteron und seine Ester und Glucosidverbindungen; Desoxycortisol
- Diacetyl-N-allyl-normorphin und seine Salze;
Diacetylnalorphin
- 1-[4'-(β-Diaethylamino-aethoxy)-phenyl]-1-(4'-tolyl)-2-(4'-chlorphenyl)-aethanol-(1) und seine Salze;
Triparanol
- 2-(N-Diaethylamino)-2'-N'-pyrrololidino-diaethylaether-dijodmethylethylat
- Diaethyldioxystilben-diphosphat
- 1,1-Diaethyl-3-hydroxy-pyrrolidinium-benzilsäure-esterbromid; Benziloniumbromid
- Diaethyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat
- 4,4'-Diamidino-diphenoxy-pentan und seine Salze; Pentamidin
- 4,4'-Diamidino-diphenoxy-propan und seine Salze; Propamidin
- 4,4'-Diamidino-2-hydroxy-stilben und seine Salze; Hydroxystilbamidin

| | |
|---|---|
| 4,4'Diamidino-stilben und seine Salze; Stilbamidin | N-(3-Dimethylamino-propyl)-thiophenyl-pyridylamin und seine Salze; Prothipendyl |
| 2,4-Diamino-azobenzol und seine Salze; Chrysoidin | Dimethylcarbaminsäure-(1-methyl-3-hydroxy-pyridinium-bromid)-ester; Pyridostigmin |
| 2,4-Diamino-5-(4'-chlorphenyl)-6-aethylpyrimidin und seine Salze; Pyrimethamin | 1,3-Dimethylol-2-mercaptop-benzimidazol; Thibenzazolin |
| 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazol und seine Salze; Amiphenazol | 2,4-Dioxo-3,3-diaethyl-tetrahydropyridin; Pyrithyldion |
| 4-[3-(5H-Dibenzo-[b,i]-azepin-5-yl)-propyl]-1-piperazin-aethanol und seine Salze | 2,2-Diphenyl-4-diisopropylamino-butylramid-methyljodid; Isopropamid |
| N,N-Dibenzyl-2-chloraethylamin und seine Salze | 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidin und seine Salze; Phenylbutazon |
| (-)-3,4-(1',3'-Dibenzyl-2'-ketoimidazolido)-1,2-trimethylen-thiophanium-camphersulfonat; Trimethapancamphersulfonat | 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-(2'-phenyl-sulfinyl-aethyl)-pyrazolidin; Sulfinpyrazon |
| 1,2-Dibromoethan (Aethylenbromid) | Di-(p-oxyphenyl)-hexen |
| 1,1-Dichloraethan (Aethylidenchlorid) | Duboisin und seine Salze 0,001 g |
| 1,2-Dichloraethan (Aethylchlorid) | Eisenverbindungen zur parenteralen Anwendung |
| zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Öl oder Weingeist, die nicht mehr als 50 Gewichtsprozente enthalten, nicht verschreibungspflichtig | Emetin und seine Salze 0,05 g |
| 2,2-Dichlor-1,1-difluor-aethyl-methyl-aether; Methoxyfluran | Erythromycin, seine Salze und Ester sowie deren Salze |
| 4,4'-Dichlor-diphenyl-trichlormethyl-methan (DDT) | Fibrinolysin |
| zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig | Filicis, Rhizoma |
| Digitalis, Folia, glykosidhaltige | 1-[3-(4-Fluor-benzoyl)-propyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin; Dehydrobenzperidol |
| Digitalis-Zubereitungen | 4'-Fluor-4-[4-hydroxy-4-(4'-chlorphenyl)-piperidino]-butyrophenon und seine Salze; Haloperidol |
| berechnet als glykosidhaltige Folia Digitalis | 4'-Fluor-4-[4'-hydroxy-4'-(tolyl-4')-piperidino]-butyrophenon und seine Salze; Methylperidol |
| Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside | 4'-Fluor-4-[4-hydroxy-4-(3'-trifluormethyl-phenyl)-piperidino]-butyrophenon und seine Salze; Triperidol |
| Diguanidine und ihre Salze zur Diabetesbehandlung | Fluorphosphorsäure-di-isopropyl-ester; Fluostigmin |
| 1,4-Dihydrazino-phthalazin und seine Salze; Dihydralazin | 4'-Fluor-4-(N-[4'-(N-piperidino)-4'-carbamido]-piperidino)-butyrophenon und seine Salze |
| Dihydroergocornin und seine Salze | Galanthamin und seine Salze |
| Dihydroergokristin und seine Salze | Gelsemii, Rhizoma |
| Dihydroergokryptin und seine Salze | Glukagon und seine Salze |
| Dihydroergotamin und seine Salze | Glycerintrinitrat (Nitroglycerin) 0,001 g |
| Dihydrokuprein, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze | Griseofulvin |
| Dihydrostreptomycin und seine Salze | Guanidin und seine Salze, auch an Eiweiß gebunden |
| die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist | Guanidine, einfach substituierte, und ihre Salze zur Diabetesbehandlung |
| Dihydrotachysterin | Gutti 0,5 g |
| 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-amino-aethanol-(1) und seine Salze; Noradrenalin | Harmin und dessen Salze |
| in Salben zum Gebrauch auf der äußeren Haut nicht verschreibungspflichtig | Hexachlorcyclohexan; HCC, HCH zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig |
| Abgabe als Arzneispezialität auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig | Hexamethylen-1,6-bis-(carbaminoylcholinbromid) |
| L-3-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-alanin und seine Salze; Methyl-dopa | Hexamethylen-1,6-bis-[methylcarbaminsäure-(1-methyl-3-hydroxy-pyridinium-bromid)-ester] |
| 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-methylamino-aethanol-(1) und seine Salze; Adrenalin | Homatropin und seine Salze 0,001 g |
| Abgabe als Arzneispezialität auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig | Hydantoin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze |
| 4,4'-Diisoamyloxythiocarbanilid | Hydrastinin und seine Salze 0,05 g |
| 1-(2',5'-Dimethoxyphenyl)-2-aminopropanol-(1) und seine Salze; Methoxamin | Hydrastis, Rhizoma 1,5 g |
| 3,5-Dimethyl-5-ethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Paramethadion | Hydrastis-Zubereitungen 1,5 g |
| (2-Dimethylamino-aethyl)-(2'-methylbenzhydryl)-aether und seine Salze; Orphenadrin | berechnet als Extractum Hydrastis fluidum DAB.6 |
| 5-(3'-Dimethylamino-2'-methylpropyl)-iminodibenzyl und seine Salze | 17 β -Hydroxy-androstane; soweit es sich handelt um: |
| 5-(3'-Dimethylamino-propyliden)-dibenzo [a,d]-[1,4] cycloheptadien und seine Salze; Amitriptylen | 17 β -Hydroxy-androstan-3-on; Stanolon |
| N-(3-Dimethylamino-propyl)-iminodibenzylum und seine Salze; Imipramin | 17 β -Hydroxy-17 α -methylandrostan-(3,2c)-pyrazol; Stanazol |
| | 17 β -Hydroxy-androstene; soweit es sich handelt um: |
| | 4,17 β -Dihydroxy-17 α -methyl- Δ ⁴ -andosten-3-on und seine Ester |
| | 17 β -Hydroxy-4-chlor- Δ ⁴ -andosten-3-on und seine Ester |

| | | | |
|--|--|------|---|
| 17 β -Hydroxy-17 α -methyl- $\Delta^1,4$ -androstadien-3-on und seine Ester; Methandrostenolon | Lobelia-Zubereitungen | 1,0 | g |
| 17 β -Hydroxy-1-methyl- Δ^1 -androsten-3-on und seine Ester; Methenolol | berechnet als Tinctura Lobeliae DAB.6 | | |
| 17 β -Hydroxy-nor-androstene; soweit es sich handelt um: | zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig | | |
| 17 β -Hydroxy-17 α -ethyl-19-nor- Δ^4 -androsten und seine Ester; Aethyloestrenol | Lobelin und seine Salze | | |
| 17 β -Hydroxy-19-nor- Δ^4 -androsten-3-on und seine Ester; Nor-Androstenolon, Nandrolon | 6-Mercaptopurin | | |
| 2-(β -Hydroxyphenyl)ethylamino)-pyridin und seine Salze; Phenyramidol | 3-(4'-Methoxyphenyl)-4,5-dithiocyclopenten-(2)-thion-(1); Anetheltrithion | | |
| 4-Hydroxy-3-(1'-phenylpropyl)-cumarin; Phenprocumarol | 2-(3'-Methoxypropyl-aminomethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze | | |
| 21-Hydroxy-pregnan-3,20-dion, seine Ester und deren Salze; Hydroxydion | 6-Methoxytropin-benzylsäureester-brommethylest; | | |
| Hyoszin und seine Salze (vgl. Skopolamin) | Tropenzilium | | |
| Hyoszyami, Folia und Herba | 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-chinazolinon und seine Salze | | |
| Hyoszyami-Zubereitungen | α -Methyl- α -ethyl-succinimid; Aethosuximid | | |
| | 3-Methylamino-isocamphan und seine Salze; Mecamylamin | | |
| | 1-Methyl-3-benziloylhydroxy-chinuclidinium-bromid; Clidinium-bromid | | |
| Hyoszyamin und seine Salze | N-(4-Methyl-benzolsulfonyl)-N'-n-butyl-harnstoff und seine Salze; Tolbutamid | | |
| Hypertensin | Methyl-bis-(2-chloroethyl)-amin und seine Salze; N-Lost | | |
| Insulin, ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes bestimmt sind | Methyl-bis-(2-chloroethyl)-amin-N-oxyd und seine Salze; N-Oxyd-Lost | | |
| Ipecacuanhae, Radix | 4-Methyl-5-(2'-chloroethyl)-thiazol und seine Salze; Chloroethiazol | | |
| Ipecacuanha-Zubereitungen | 3-Methyl-3,4-dihydroxy-4-phenyl-butin-(1) | | |
| | 3,3'-Methylen-bis-(4-hydroxy-cumarin) | | |
| Isonikotinaldehyd und seine Abkömmlinge | Methylergobasin (Methylergonovin) und seine Salze | | |
| Isonikotinsäurehydrazid, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze; INH, Isoniazid | 1-Methyl-2-mercato-imidazol; Methimazol, Thiamazol | | |
| N-Isopropyl-2-methyl-2-n-propyl-1,3-propandiol- dicarbamat und seine Salze; Carisoprodol | 2-Methyl-3-(2'-methyl-3'-chlorophenyl)-4(3H)-chinazolinon und seine Salze; 3'-Chlormethaqualon | | |
| Jalapae, Resina | N-Methyl- α -methyl- α -phenyl-succinimid; Methsuximid, Mesuximid | | |
| Jalapae-resina-Zubereitungen | 3-Methyl-pentanol-(3)-carbamat; Emylecamat | | |
| | 3-Methyl- β -pentin-3-ol und seine Ester; Methylpentynol | | |
| Jalapae, Tubera | 1-(2'-Methylphenoxy)-propan-2,3-diol; Mephenisin | | |
| 5-Jod-2'-desoxy-uridin | N-Methyl- α -phenyl-succinimid; Phensuximid | | |
| Jodschwefel | 1-(N-Methyl-piperidyl-4')-3-phenyl-4-aethyl-pyrazolon-5 und seine Salze; Piperylon | | |
| | 2-Methyl-2-n-propyl-propandiol-(1,3)-dicarbamat; Meprobamat | | |
| zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig | N-Methyl-skopolamin (N-Methyl-hyoscine) und seine Salze | | |
| Jodtinktur | (1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-pyrimidyl-2)-methyl- α -cyclohexyl- α -phenyl-glycolat und seine Salze; Oxyphencyclimin | | |
| zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig | 2-Methyl-3-o-tolyl-4-chinazolinon und seine Salze; Methaqualon | | |
| Kalium-antimonyl-tartrat (Brechweinstein) | Mitomycin C | | |
| Kaliumdichromat | β -Naphthyl-bis-(2-chloroethyl)-amin und seine Salze; Chlornaphazin | | |
| Kanamycin und seine Salze | Narkotin und seine Salze (vgl. Opiumalkaloide) | | |
| die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist | Natrium-antimonyl-tartrat | | |
| Kantharidin | Natrium-Goldchlorid | 0,05 | g |
| Kirschchlorbeerwasser vgl. Bittermandelwasser | Natriumnitrit | 0,3 | g |
| Kolchizin und seine Salze | Neomycin A, B und C und ihre Salze | | |
| Koniin und seine Salze | in Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je je Stück abgeteilter Arz- | | |
| Kreosot | | | |
| 0,2 g zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichts- prozente enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig | | | |
| Lactuca virosa-Zubereitungen | | | |
| | | | |
| | | | |
| Lespedeza capitata | | | |
| Lobeliae, Herba | | | |

| | | |
|--|---------|---|
| neiform (Pastillen, Tabletten, Ovula u. ä.) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Neomycin enthalten, nicht verschreibungspflichtig | | 1-(2'-Phenylaethyl)-4-(N-propionyl-anilino)-piperidin und seine Salze; Phentanyl |
| Nikotin und seine Salze | 0,001 g | 2-Phenylchinolin-4-carbonsäure, ihre Salze und Ester; Cinchophen |
| in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Tieren nicht verschreibungspflichtig | | 1-Phenyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-(2'-diaethylamino-ethyl)-ester und seine Salze; Caramiphen trans-d,1-2-Phenyl-cyclopropylamin und seine Salze; Tranylcypromin |
| N-(5-Nitro-2-furylidien)-1-amino-hydantoin; Nitrofurantoin | | α -Phenyl- α -(2'-diaethylamino-ethyl)-glutarimid und seine Salze; Phenylglutarimid |
| N-(5-Nitrofurylidien)-3-amino-2-oxazolidon; Furazolidon | | D-2-Phenyl-3,4-dimethyl-1,4-tetrahydrooxazin und seine Salze; Phenidimetrazin |
| 3-[α -(4'-Nitrophenyl)- β -acetyl-aethyl]-4-oxycumarin; Acenocumarol | | 1-Phenyl-2-(4'-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butyl-pyrazolidin und seine Salze; p-Hydroxy-phenylbutazon |
| D(-)-threo-1-(4'-Nitrophenyl)-2-acidoacetamido-1,3-propanediol, seine Ester und Verbindungen; Azidoamphenicol | | 5-Phenyl-2-imino-4-oxo-oxazolidin; Phenoxazol |
| Novobiocin und seine Salze | | 2-Phenylisopropyl-hydrazin und seine Salze; Pheniprazin |
| [2-(Octahydro-1'-azocinyl)-aethyl]-guanidin und seine Salze; Guanethidin | | 2-Phenyl-3-methyl-morpholin, seine Salze und seine Verbindungen mit Purinen; Phenmetrazin |
| Oleander-Glykoside | | 1-Phenyl-1-(2'-piperidyl)-1-acetoxy-methan [Essigsäure-(phenyl-2-piperidyl)-methylester] |
| Oleandomycin und seine Salze | | Phenyl-piperidyl-(2)-essigsäure-methyl-ester und seine Salze; Methylphenidat |
| Oleum Amygdalarum amarum aetherum, blausäurehaltiges | 0,2 g | 3-Phenyl-1-propanolcarbamat; Proformiphen |
| Oleum Chenopodii anthelmintichi | | Phosphor |
| Oleum Crotonis | | Phosphorsäure-methyl-(2-chlor-4-tertiär-butyl-phenyl)-di-ester-methylamid |
| Oleum Sabinae | | die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist |
| Opiumalkaloide und ihre Salze | 0,1 g | N-Phthalyl-glutaminsäure-imid und seine Salze; Thalidomid |
| soweit die Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, in der derzeit geltenden Fassung geregelt ist | | Physostigmin und seine Salze |
| Osmiumsäure und ihre Salze | 0,001 g | 0,001 g |
| 3-(3-Oxo-7 α -acetylthio-17 β -hydroxy-4-androsten-17 α -yl) propionsäure- γ -lacton; Spironolacton | | Pikrotoxin |
| 1-Oxo-3-(3'-sulfamyl-4'-chlor-phenyl)-3-hydroxyisoindolin und seine Salze | | Pilocarpin und seine Salze |
| Oxytetracyclin (Hydroxytetracyclin) und seine Verbindungen | | (2-Piperidyl)-benzhydrol und seine Salze; Pipradrol |
| die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist | | 3-(1'-Piperidyl)-1,1-diphenyl-propanol-(1) und seine Salze |
| Papaverin und seine Salze (vgl. Opiumalkaloide) | | 2-(1'-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze; Piperoxan |
| Papaveris, Fructus, maturi et immaturi | | 3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-bicycloheptenyl-propanol-(1) und seine Salze; Biperiden |
| soweit ihre Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, in der derzeit geltenden Fassung geregelt ist | | 3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1) und seine Salze; Trihexylphenidyl |
| Paraldehyd | | Podophyllum emodi, Radix und Rhizoma |
| Paramomycin und seine Salze | | Podophyllum emodi-Glykoside und ihre Abkömmlinge, z. B. Podophyllotoxin- β -D-benzylidenglykosid |
| N,N,N',N'-3-Pentamethyl-N,N'-diaethyl-3-aza-pentylen-1,5-diammonium-Salze; Azamethonium | | Podophyllum peltatum, Radix und Rhizoma |
| Pentamethylen-1,5-bis-(N-methyl-pyrrolidinium)-Salze; Pentolonium | | Podophyllin, auch indisches |
| β , β -Pentamethylen- γ -hydroxybuttersäure und ihre Salze; Hexacyclonsäure | | Podophyllotoxin und seine Abkömmlinge, z. B. Podophyllinsäure-aethylhydrazidin |
| Perchlorsäure und ihre Salze | | Polymethoniumverbindungen; soweit es sich handelt um: |
| Phenothiazin | | Hexamethylen-1,6-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze; Hexamethonium-Salze |
| Phenothiazin, am Stickstoff substituiertes, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze | | Pentamethylen-1,5-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze; Pentamethonium-Salze |
| 3-[α -Phenyl- β -acetyl-aethyl]-4-oxycumarin und seine Salze; Warfarin | | Polymyxin B und seine Salze |
| Phenylacetylharstoff und seine Salze; Phenacemid | | die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist |
| Phenylaethyllessigsäure-(2-phenyl-3-methyl-morpholino-N-aethanol)-ester und seine Salze | | Propionsäure-(3'-dimethylamino-2'-methyl-1'-phenyl-1'-benzyl-propyl)-ester und seine Salze; Propoxyphen |
| α -Phenyl- α -ethyl-glutarimid; Gluthetimid | | 4-Propylamino-benzoësäure-(3'-dimethylamino-2'-hydroxy-propyl)-ester und seine Salze |
| 5-Phenyl-5-ethyl-hexahydropyrimidin-4,6-dion und seine Salze; Primidon | | Proteolytische Enzyme tierischen oder pflanzlichen Ursprungs zur parenteralen Injektion |
| 2-Phenylaethyl-hydrazin und seine Salze; Phenelzin | | Pteroyl-triglutaminsäure und ihre Salze; PTGA, Pteropterin |

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Pulsatillae, Herba | 0,2 | g | N-(4'-Sulfamyl-phenyl)-butansulfonamid-(1,4) und seine Salze |
| Pulsatilla-Zubereitungen | 0,2 | g | Tetraethylammonium-Salze |
| berechnet als Herba Pulsatillae Erg. B.6 | | | Tetraethyl-thiuron-disulfid; Disulfiram |
| Pyrazin-3-carbonsäureamid und seine Salze; Pyrazinamid | | | Tetrachloroethylen zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig |
| Pyrophosphorsäure-tetra-isopropyl-ester | | | Tetrachlorkohlenstoff |
| Pyrrolidinomethyl-tetracyclin und seine Salze | | | 4,5,6,7-Tetrachlor-2-(2'-trimethylammonium-aethyl)- N-methyl-isoindolinium-dichlorid; Chlorisondamin |
| 3-Pyrrolidino-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1); Procyclidin | | | Tetracyclin und seine Verbindungen die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist |
| Quecksilbersalbe (graue Salbe) mit einem Gehalt von mehr als 10 Gewichtsprozenten Quecksilber | | | Thalliumsalze |
| Quecksilberverbindungen | | | Theophyllin und seine Salze 0,5 g |
| rotes Quecksilbersulfid (Zinnober) und nicht mehr als 5 Gewichtsprozente weißes Quecksilberpräzipitat oder rotes Quecksilberoxyd enthaltende Salben zum äußeren Gebrauch, ferner am Mann anzuwendende Zubereitungen in Kleinpackungen zur Verhütung von Geschlechtskrank- heiten mit nicht mehr als 2,75 Gewichtsprozenten Chinin- mercuribisulfat nicht verschreibungspflichtig | | | Thevetin (aus Thevetia nerifolia) |
| Quellfähige Drogen und andere quellfähige Stoffe in Form von Stiften, Sonden, Meißeln oder dergleichen | | | Thiobarbitursäure-Abkömmlinge und ihre Salze |
| Rauwolfia-Alkaloide (z. B. Deserpidin, Rescinnamin, Reserpin) und ihre Salze | | | Thiouracil und seine Abkömmlinge |
| Sabinae, Summitates | | | Thyreoidae, Glandulae, siccatae |
| zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig | | | D-Thyroxin und seine Salze |
| Santonin | | | 2-(N-4'-Tolyl-N-3'-hydroxyphenyl-aminomethyl)- imidazolin; Phentolamin |
| Scammoniae, Resina | 0,3 | g | 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridin; Triamteren |
| Schilddrüsen-Wirkstoffe und ihre Salze (z. B. Dijodtyrosin, Thyroxin, Triiodthyronin) | | | 2,2,2-Tribrom-aethanol-(1) |
| Scilla-Glykoside | | | 1,1,2-Trichloroethylen zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig |
| Secale cornutum | | | 1,1,2-Trichlor-butylaldehyd-hydrat; Butylchloralhydrat |
| Secale-Alkaloide und ihre Salze | | | 3,12,16-Trihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-17-[1'-carboxyisooct-4'-enyliden-(1')]- cyclopentanoperhydrophenanthren-16-acetat (Fusidinsäure), seine Salze und Ester |
| Selenverbindungen | | | N-(3-Trimethylammonium-propyl)-N-methyl- camphidinium-dimethylsulfat; Trimethidinium-methylsulfat |
| Silbernitrat | 0,03 | g | 3,5,5-Trimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Trimethadion |
| zum äußeren Gebrauch und in Augentropfen zur Blennorrhoe-Prophylaxe nicht verschreibungspflichtig; die Ab- gabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxis- bedarf zulässig | | | 2,3,5-Tris-aethylenimino-benzochinon-(1,4) |
| Skopolamin und seine Salze | 0,001 | g | 2,4,6-Tris-(aethylenimino)-1,3,5-triazin; Triethylenmelamin, Tretamin |
| Stoffe und Zubereitungen in Form von Fertigwaren, die zur Behebung der Amenorrhoe (Blutstockung) bestimmt sind, auch wenn sie als Mittel gegen Regel-, Perioden- oder Menstruationsstörungen angekündigt werden | | | Tris-(2-chloraethyl)-amin und seine Salze |
| Stramonii, Folia und Semen | 0,2 | g | N,N,O-Tris-(2-chloraethyl)-N'-(3-hydroxypropyl)- phosphorsäure-ester-diamid |
| Stramonium-Zubereitungen | 0,2 | g | 2,4,6-Tris-(methyloxamino)-1,3,5-triazin; Trimethylolmelamin |
| berechnet als Folia Stramonii DAB.6 | | | 1,2,3-Tris-(2'-triaethylammonium-aethoxy)-benzol-Salze |
| Fol. Stramonii-Zubereitungen zum Rauchen und Räu- ichern nicht verschreibungspflichtig | | | Tropasäure-(N-aethyl-N-4-picoly)-amid |
| Streptokinase | | | Tuberkuline, flüssige und trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergestellten Erzeugnisse |
| zur buccalen Anwendung auch im Gemisch mit Strepto- dornase nicht verschreibungspflichtig | | | d-Tubocurarin und seine Salze |
| Streptomycin und seine Salze | | | d-Tubocurarin-dimethyläther und seine Salze; Dimethyl-d-tubocurarin |
| die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist | | | Urethan (Aethylurethan) |
| Strophanthi, Semen | | | Vancomycin und seine Salze |
| Strophantidine, einschließlich Ouabain | | | Veratri, Rhizoma |
| Strychni, Semen | 0,1 | g | zum äußeren Gebrauch, in konzentrierter Form jedoch nur bei Tieren, und als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurzel nicht verschreibungspflichtig |
| Strychnos-Zubereitungen | 0,05 | g | Veratrin und seine Salze |
| berechnet als Extractum Strychni DAB.6 | | | Veratrum-Alkaloide und ihre Salze |
| Strychnin und seine Salze | 0,01 | g | Vinblastin (Vinkaleukoblastin) und seine Salze |
| Strychnin-N-oxyd und seine Salze | | | Viomycin und seine Salze |
| Strychninsäure und ihre Salze | | | Weibliche Geschlechtshormone (Follikelhormon, Corpus-luteum-Hormon) |

| | |
|--|---|
| Pflanzenstoffe sowie synthetische und halbsynthetische Stoffe mit den Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone (z. B. Abkömmlinge des Oestrans und des Stilbens, wie Norethynodrol, Lynoestrenol); weibliche Geschlechtshormone enthaltende Zubereitungen zur Verfütterung an Geflügel sowie weibliche Geschlechtshormone enthaltende Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle (kosmetische Mittel) sind von der Verschreibungspflicht ausgenommen | Yohimboasäure, ihre Salze und Ester sowie deren Salze Zinksalze, wasserlösliche in Augentropfen und zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig |
| Xanthencarbonsäure-diaethylaminoethyl-ester-methylbromid | Zubereitungen pasten-, salbenartiger oder ähnlicher Beschaffenheit zur Einführung in die Gebärmutter. Abgabe nur gestattet, wenn die Verschreibung den Vermerk trägt, daß die Zubereitung zu Händen des Arztes bestimmt ist |
| Xanthocillin und seine Salze | Zyanessigsäurehydrazid und seine Salze |
| Yohimbin und seine Salze | Zyanwasserstoffsäure und ihre Salze |
| | 0,001 g |
| | — GV.NW. 1963 S. 271. |

**302 Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Errichtung
von Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten**

Vom 8. August 1963

Auf Grund der §§ 14, 17 Absatz 3 und 33 des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 3. September 1953 (BGBl. I S. 1267) und des § 1 des Gesetzes über Rechtsverordnungen im Bereich der Gerichtsbarkeit vom 1. Juli 1960 (BGBl. I S. 481) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über den Erlaß von Rechtsverordnungen im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit vom 6. Juli 1960 (GV. NW. S. 210/SGV. NW. 302) wird im Einvernehmen mit dem Justizminister und nach Anhörung der in § 14 des Arbeitsgerichtsgesetzes genannten Verbände verordnet:

§ 1

In § 4 der Verordnung über die Errichtung von Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten vom 25. Juli 1960 (GV. NW. S. 301/SGV. NW. 302) werden die Wörter „Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Buer“ gestrichen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Der Arbeits- und Sozialminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Grundmann

— GV.NW. 1963 S. 279.



Einzelpreis dieser Nummer 1,— DM.

Einzellieferungen nur durch den August Bagel Verlag, Düsseldorf, gegen Voreinsendung des Betrages zuzügl. Versandkosten (Einzelheft 0,25 DM) auf das Postscheckkonto Köln 85 16 oder auf das Girokonto 35 415 bei der Rhein. Girozentrale und Provinzialbank Düsseldorf. (Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.)

Herausgegeben von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mannesmannufer 1 a. Druck: A. Bagel, Düsseldorf; Vertrieb: August Bagel Verlag Düsseldorf. Bezug der Ausgabe A (zweiseitiger Druck) und B (einseitiger Druck) durch die Post. Gesetz- und Verordnungsblätter, in denen nur ein Sachgebiet behandel ist, werden auch in der Ausgabe B zweiseitig bedruckt geliefert. Bezugspreis vierteljährlich Ausgabe A 5,50 DM, Ausgabe B 6,60 DM.